

## Donaciini (Col., Chrysomelidae) uit Drenthe

door

W. BEIJERINCK

De submers levende *Macrolea appendiculata* Panz. werd tot-nutoe niet door mij in Drente aangetroffen. Van het genus *Donacia* verzamelde ik de volgende soorten en vormen :

1. *Donacia clavipes* Fabr. (*D. menyanthidis* F.)

Vindpl. : Wijster („Turfveen”), 4.VI.'42, op *Eriophorum polystachyum*, te zamen met *D. thalassina*; Lheebroek, 31.V.'42, op *Carex rostrata*, te zamen met *D. aquatica*, *D. vulgaris*, *D. obscura* en *D. bicolor*. Naast de fraai groene kwamen ook meer bronskleurige exx. voor.

2. *Donacia crassipes* Fabr. (*D. micans* Hoppe; *D. striata* Panz.)

Vindpl. : Plas ten Z. van Ansen („Armweide”), 19 Nov. 1941. Een enkel, op zwarten ondergrond groen en violet gekleurd exemplaar. Niet alleen is het tijdstip, maar ook de localiteit merkwaardig, daar *Nymphaea* en *Nuphar* in deze plas niet voorkomen, daarentegen wel : *Potamogeton*, *Typha* en hooge *Carices*.

3. *Donacia semicuprea* Panz. (*D. moerens* Knze.)

Vindpl. : Lhee, 6.VI.'42; Hoogeveen, 9.VI.'42; Ansen, 23.V.'42; Dwingeloo, 6.VI.'42; Lheebroek, 20.V.'43; Veenhuizen, 14.V.'42. Vooral op *Glyceria aquatica*. Waarschijnlijk een der meest voorkomende soorten in het gebied. Zoowel groene als zwartgroene en exx. met koperkleurig middengedeelte en bijna geheel koperroode werden aangetroffen.

4. *Donacia sparganii* Ahr.

Vindpl. : Hoogeveen („Pesserdijk”), Juli 1929, langs slootkanten op *Sparganium simplex*. Zoowel exx. met donker violetten weerschijn als blauwgroene werden gevangen.

5. *Donacia aquatica* L. (*D. dentipes* F.; *D. coccineofasciata*

Harrer)

Vindpl. : Lheebroek, 31.V.'42; Ansen, 23.V.'42. Op *Carex rostrata* en *Glyceria aquatica*. Vertoonde weinig variatie in kleur, echter wel in grootte.

6. *Donacia impressa* Payk.

Vindpl. : Dwingeloo, 6.VI.'42; Lheebroek, 20.V.'43. Op *Carex filiformis* en *Glyceria aquatica*. Donker bronskleurig.

7. *Donacia marginata* Hoppe (*D. lemnae* F.; *D. lateralis* Bon.; *D. limbata* Panz.; *D. vittata* Panz.)

Een enkel ex. werd gevangen bij Dwingeloo, langs de Dwingeloër Stroom, op 6.VI.'42.

8. *Donacia thalassina* Germ.

Vindpl. : Wijster („Turfveen”), 27.V.'42, 1, 17 en 20.VI.'42;

Esmeer bij Veenhuizen, 24.VI.'42. Ook meermalen langs andere heiplassen aangetroffen. In groot aantal op *Eriophorum polystachyum* en *Scirpus palustris*. Veelvuldig komt de fraai purperroode tot donker violetpurperen vorm: a. *porphyrogenita* Westh. voor, alsmede een groene vorm en overgangen tusschen de gewone koperkleurige en de purperen vorm.

9. *Donacia vulgaris* Zschach (*D. typhae* Ahr.)

Vindpl.: Lheebroek, 20.V.'43, 31.V.'42. Op *Carex rostrata* en filiformis. Slechts enkele exx. van donkere bronskleur.

10. *Donacia brevicornis* Ahr. (*D. platysterna* Thoms.)

Vindpl.: Wijster, 1.VI.'42; Lheebroek, 20.V.'43; Dwingeloo, 6.VI.'42, op *Eriophorum*, *Carex* en *Glyceria*, telkens een enkel exemplaar.

11. *Donacia obscura* Gyll.

Vindpl.: Ansen, 23.V en 19.VI.'42; Lheebroek, 31.V.'42, op *Carex*- en *Eriophorum*-vegetaties in het elzenbroek. Zeer donker bronskleurig, mat.

12. *Donacia bicolor* Zschach (*D. sagittariae* F.; *D. aurea* Hoppe)

Vindpl.: Hoogeveen, 28.VII.1930; Lheebroek, 31.V.'42 en 20.V.'43; Dwingeloo, 6.VI.'42; Ansen, 23.V.'42, op *Carex rostrata* en filiformis en op *Glyceria aquatica*. Naast de meer goudgroene en bronskleurige exx. kwamen ook zeer donkere violetblauwe exx. voor.

13. *Donacia cinerea* Hrbst. (*D. hydrocharis* F., *D. tarsata* Panz.)

Vindpl.: Ansen, 19.VI.'42; Dwingeloo, 6.VI.'42; Wijster, 4.VI.'42. Op *Typha*.

Van het genus *Plateumaris* werden de beide onderstaande soorten en vormen aangetroffen:

14. *Plateumaris discolor* Panz.

Vindpl.: Wijster („Turfveen”), 27.V.'42; Ansen, 23.V.'42. Te Wijster op *Eriophorum* en te Ansen op *Glyceria aquatica*. Overwegend donker bronskleurig, een enkel ex. meer groen.

15. *Plateumaris sericea* L.

Vindpl.: Ansen, 23.V en 19.VI.'42; Lheebroek, 20.V.'43, steeds op *Glyceria*. Sterk varierend in kleur. De meeste exx. waren donker bronskleurig, maar daarnaast werden aangetroffen: de helder blauwe en donker violette vorm, a. *festucae* F. (*violacea* F., *atropurpurea* Westh.), alsmede paarse, blauwgroene en de fraai purperroode vorm, a. *nymphaeae* F. (*aenea* Hoppe).

Van alle hier genoemde Donaciini blijft alleen *Donacia thalassina* beperkt tot het meer oligotrophe milieu der heideplassen, terwijl van de overige, alle meer in eutroof milieu aangetroffen soorten, enkele, zooals *D. clavipes* en *discolor* mede in het heiplassen- en hoogveengebied doordringen. Het optreden van *D. cinerea* langs een heiplas te Wijster is te verklaren door het voorkomen van *Typha* aldaar. Ook *Plateumaris discolor* kwam op *Eriophorum*, te zamen met *D. thalassina* voor.

Terwijl F r. P e u s (1923) <sup>1)</sup> *D. thalassina* wel vermeldt uit het N.W. Duitsche veengebied, komt deze soort niet meer voor in zijn : Tierwelt der Moore (1932) <sup>2)</sup>. Wel vermeldt hij : *Haltica sandini* Kemner als tyrphobionte hoognoordelijke Chrysomelide, die ook in ons land schijnt voor te komen.

<sup>1)</sup> F r. P e u s, Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt nordwestdeutscher Hochmoore. Zeitschr. f. Morph. u. Ökologie der Tiere, Bd. 12.H.¾, p. 582.

<sup>2)</sup> F r. P e u s, Die Tierwelt der Moore. 1932. Handb. d. Moorkunde v. K. v. Bülow, Bd. III p. 124.

---